
# Cuadro de dosificación de acetaminofén para bebés y niños de 11 años o menos



#### Qué puedes hacer

- Siempre lee y sigue las instrucciones en la etiqueta del medicamento.
- Calcula la dosis para el peso actual de tu hijo. Si no estás seguro del peso de tu hijo, utiliza la edad. A medida que los niños crecen, las dosis cambian.
- Utiliza solamente la medida dosificadora que viene con el medicamento (jeringa o vaso dosificador).
- Espera la cantidad correcta de tiempo entre cada dosis. Si administras otra dosis demasiado pronto, podrías hacerle daño a tu hijo.

  Consulta las instrucciones de dosificación del ibunrofe



Consulta las instrucciones de dosificación del ibuprofeno. ▶

# Cuadro de dosificación de ibuprofeno para bebés y niños de 11 años o menos

lbuprofeno	De ser posible, usa el peso para determinar la dosis; de lo contrario, usa la edad.							
<b>ml</b> = mililitro <b>mg</b> = miligramo	< 6 meses	<b>12 a 17 lb</b> 6 a 11 meses	<b>18 a 23 lb</b> 12 a 23 meses	<b>24 a 35 lb</b> 2 a 3 años	<b>36 a 47 lb</b> 4 a 5 años	<b>48 a 59 lb</b> 6 a 8 años	<b>60 a 71 lb</b> 9 a 10 años	<b>72 a 95 lb</b> 11 años
Gotas concentradas de ibuprofeno para bebés por ejemplo Concentrated Motrin® Infants' Drops 50 mg por 1.25 ml	Consulta con un profesional de atención médica	1.25 ml	1.875 ml					
Ibuprofeno líquido para niños  por ejemplo Children's Advil® Suspension		Consulta con un profesional de atención médica		5 mL	7.5 mL	10 mL	12.5 mL	15 mL
100 mg por 5 ml				5 ml	7.5 ml	10 ml	12.5 ml	15 ml
Tabletas masticables								
de ibuprofeno en dosis para jóvenes por ejemplo			Consulta con ur profesional de					
Junior Strength Advil® Chewables 100 mg por tableta masticable			atención médica			2 tabletas masticables	2½ tabletas masticables	3 tabletas masticables

### Instrucciones importantes

Puedes repetir la dosis cada 6 a 8 horas mientras duren los síntomas.

NO administres más de 4 dosis en 24 horas.

Habla con el profesional de atención médica de tu hijo antes de darle cualquier otro producto que contenga un AINE\*.



\*Medicamento antiinflamatorio no esteroideo

#### Qué puedes hacer

- Siempre lee y sigue las instrucciones en la etiqueta del medicamento.
- Calcula la dosis para el peso actual de tu hijo. Si no estás seguro del peso de tu hijo, utiliza la edad. A medida que los niños crecen, las dosis cambian.
- Utiliza solamente la medida dosificadora que viene con el medicamento (jeringa o vaso dosificador).
- Espera la cantidad correcta de tiempo entre cada dosis. Si administras otra dosis demasiado pronto, podrías hacerle daño a tu hijo.

Consulta las instrucciones de dosificación del acetaminofén.



Get Relief Responsibly®